

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 21 juillet 1918.

Présidence de M. J. DE JOANNIS, ancien Président.

Changement d'adresse. — M. le D^r P. MARCHAL, 45, rue de Verrières, Antony (Seine).

Présentation. — M. le capitaine J. DUBRETON, comm^t la 2^e S. M. A. 242^e régiment d'artillerie, présenté par M. J. MAGNIN. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. HONORÉ et R. PESCHET.

Communications.

Notes sur la synonymie de plusieurs Araignées
de la famille des *Clubionidae*

par E. SIMON.

I. — *Clubiona virescens* Sundevall me paraît ne pouvoir être que *Chiracanthium nutritrix* Westring (non Walckenaer) pour lequel j'avais proposé le nom de *C. lapidicolens* adopté par KULCZYNSKI. Il devra s'appeler *Chiracanthium virescens* Sund.

II. — Je suis arrivé à la conclusion que *Chiracanthium erraticum* Cambr., E. Simon (*Clubiona nutritrix* Bl.) n'est que le grand développement de *C. erraticum* Walckenaer; la présence de petites épines fémorales tient à ce développement; l'absence de longs poils dressés au tibia de la patte-mâchoire, indiquée par O. P. CAMBRIDGE, est sans doute accidentelle, ces poils tombant facilement.

III. — *Clubiona Canestrinii* G. Castelli, in *Atti Soc. Venet. tr. S. N.*, ser. 2, 1, p. 9, ff. 1-2 (1892), est à ajouter à la synonymie de
Bull. Soc. ent. Fr. [1918], — N° 14.

C. similis L. Koch. A l'époque où l'auteur m'avait consulté au sujet de cette espèce, je confondais *C. neglecta* Cb. et *C. similis* L. K. et je l'avais comparée à un mâle typique du premier.

IV. — *Clubiona vegeta*, nov. nom. — Nom nouveau proposé pour *C. parvula* Lucas, préoccupé par *C. parvula* Blackwall, synonyme de *Dictyna arundinacea*. — L. Koch avait répandu l'espèce sous le nom inédit de *C. vegeta* que je conserve.

V. — *Clubiona stigmatica* E. Simon est synonyme de *C. genevensis* L. Koch, 1867, et devra prendre ce nom. Plusieurs auteurs ont parlé de cette espèce sous le nom de *C. decora* Blackwall par confusion avec le vrai *C. decora* Bl., de Madère.

VI. — *Agraeca Haglundii* Thorell, E. Simon, etc., est le vrai *A. brunnea* Bl. — L'espèce que, d'après THORELL, j'ai décrite sous le nom d'*A. brunnea*, doit s'appeler *A. lusatica* L. Koch, 1874.

VII. — *Agraeca inopina* O.P. Cambridge (in *Pr. Dorset Cl.*, [1886], p. 2, tab. 4, fig. 4), que je confondais autrefois avec *A. proxima* Cambr., est assez répandu en France.

VIII. — *Agraeca chrysea* L. Koch est synonyme d'*A. pullata* Thorell et devra en prendre le nom.

IX. — *Aranea relucens* Latr., souvent cité en synonymie de *Micaria fulgens* Walckenaer, n'y correspond que pour une partie, car la description de LATREILLE montre que plusieurs espèces ont été confondues par lui, particulièrement *M. pulicaria* Sund. — Cette description ne date que de 1804 et du tome VII de l'« Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes » (dans son « Genera », LATREILLE renvoie bien à son « Histoire des Fourmis » (1802), mais dans ce dernier ouvrage *Aranea relucens* est cité sans description).

Abondance exceptionnelle de la chenille d'*Hybernia defoliaria* Hb.
[LEP. GEOMETRIDAE]

par J. DE JOANNIS.

Dans le *Bulletin Soc. ent. Fr.* [1917], p. 242, j'ai signalé la capture, d'une précocité anormale, que M. J. AUNEAU a faite l'an dernier du papillon *Hybernia defoliaria* Hb. au Bois de Boulogne.

Comme suite à ces observations, M. J. AUNEAU m'a signalé récemment l'excessive abondance de la chenille de cette espèce au même